


сильное возбуждение, судороги конечностей с последующим параличом. Являются препаратами контактно – кишечного действия, характеризующиеся широким спектром действия.

- ЦУНАМИ, КЭ (циперметрин, 100 г/л).

НЕОНИКОТИНОИДНЫЕ ИНСЕКТИЦИДЫ характеризуются выраженным системным действием и биологической активностью по отношению к сосущим и листогрызущим насекомым. Как и пиретроиды, неоникотиноиды у насекомых блокируют передачу нервных импульсов, и они погибают от нервного перевозбуждения.

- МУССОН, ВРК (имidakлоприд, 200 г/л).

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР



*препарат находится на стадии регистрации

doctorfarmer.ru

контактная информация

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Doctor
Farmer



КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ

Урожайность зерновых культур в значительной степени зависит от степени зараженности семенного материала, засоренности посевов сорняками и степени повреждения вредителями и болезнями. Для решения этих проблем мы предлагаем самый широкий ассортимент пестицидов, включающий в настоящее более 40 наименований, при правильном комбинировании которых можно составить оптимальную систему защиты, наиболее полно соответствующую фитосанитарной обстановке на каждом конкретном поле.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ

ФУНГИЦИДЫ – ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН

По результатам фитосанитарного анализа семян, как правило, возникает необходимость в обработке посевного материала от семенных и почвенных инфекций. Широким спектром действия с высокой биологической эффективностью характеризуются комбинированные препараты на основе двух – трех действующих веществ, нередко относящихся разным химическим классам:

- АЛЬКАСАР, КС (ципроконазол, 30 г/л + дифеноконазол, 6,3 г/л);
- ТУРИОН, КЭ (имазалил, 66 г/л + прохлораз, 132 г/л + тритикоконазол, 56 г/л);
- ФОРПОСТ, КС (флутриафол, 25 г/л + тиабендазол, 25 г/л).

Не меньшей популярностью пользуются однокомпонентные препараты:

- КАРДОН, КС (карбендазим, 500 г/л);
- РЕДУТ, КС (тебуконазол, 60 г/л).

ФУНГИЦИДЫ ПО ВЕГЕТАЦИИ

В защите от инфекций, передающихся воздушно – капельным путем во время вегетации, рекомендуется использовать следующие препараты:

- ЗЕНОН АЭРО, КЭ (тебуконазол, 125 г/л + флутриафол, 100 г/л);
- КАРДОН, КС (карбендазим, 500 г/л);
- РЕКРУТ, КС (ципроконазол, 400 г/л).

ГЕРБИЦИДЫ

ГЕРБИЦИДЫ НА ОСНОВЕ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИН – системные препараты широкого спектра действия, обладающие высокой биологической активностью, избирательностью, системным продолжительным действием в борьбе с однолетними и некоторыми многолетними двудольными сорняками.

- ДУКАТ, ВДГ (триасульфурон, 750 г/кг);

ТУРИОН МАКСИМАЛЬНО ШИРОКИЙ СПЕКТР действия, наивысшая эффективность ПРОТИВ ОСНОВНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ семенных и почвенных инфекций



- МЕТУРОН, ВДГ (метсульфурон-метил, 600 г/кг);
 - СТАЛКЕР, ВДГ (трибенурон-метил, 750 г/кг).
- ЭФИРЫ 2,4-Д КИСЛОТЫ, ДИКАМБЫ КИСЛОТЫ И КЛОПИРАЛИДА являются синтетическими аналогами растительных гормонов роста. В растительных организмах они замещают природные гормоны, в результате чего происходит перенасыщение чувствительных видов синтетическими гормонами, что ведет к нарушению их роста с последующей гибелью.
- КЛОПЭФИР, КЭ (2,4-Д кислота и клопиралид в виде сложных 2-этилгексильных эфиров, 410 г/л + 40 г/л);
 - ЭЛАНТ, КЭ (2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексильного эфира, 564 г/л);
 - ЭЛАНТ-ПРЕМИУМ, КЭ (2,4-Д кислота и дикамбы кислоты в виде сложных 2-этилгексильных эфиров, 420 г/л + 60 г/л).

КОМБИНИРОВАННЫЕ ГЕРБИЦИДЫ (заводские бинарные упаковки)

Бинарные упаковки гербицидов состоят из двух – трех препаратов, при смешении которых проявляется максимальный эффект синергизма против всего спектра двудольных сорняков с минимальными затратами на обработку. За счет одновременного применения действующих веществ с разными механизмами действия, решается проблема формирования устойчивых сорняков.

- БИАТЛОН М (ЭЛАНТ, КЭ + СТАЛКЕР, ВДГ);
- ТРИАТЛОН М (ЭЛАНТ-ПРЕМИУМ, КЭ + СТАЛКЕР, ВДГ);
- ЭЛАМЕТ М (ЭЛАНТ, КЭ + МЕТУРОН, ВДГ);
- КЛОПЭФИР МИКС (КЛОПЭФИР, КЭ + СТАЛКЕР, ВДГ);
- БИАТЛОН ПЛЮС (ЭЛАНТ, КЭ + СТАЛКЕР, ВДГ + ДУКАТ, ВДГ);
- ЭЛАСТЕР (ЭЛАНТ, КЭ + СТАЛКЕР, ВДГ).

ГЕРБИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ДИКАМБЫ КИСЛОТЫ, КЛОПИРАЛИДА И МЦПА отличаются широким спектром действия, уничтожают наиболее распространенные виды двудольных сорняков.

- АЙВЕР, ВРК (МЦПА кислота в виде смеси натриевой, калиевой и диметиламинной солей, 500 г/л);
- ДИАМАНТ, ВР (дикамбы кислоты в виде диметиламинной соли, 480 г/л);
- КЛОПИРИД, ВДГ (клопиралид, 750 г/кг).

ГРАМИНИЦИДЫ используются в борьбе с однолетней злаковой сорной растительностью в посевах пшеницы и ячменя. Обработку рекомендуется проводить в ранние фазы развития сорняков (2-3 листа) независимо от фазы развития культуры.

- ТАЙПАН, КЭ* (феноксапроп-П-этил + клодинафоп-пропаргил + мефенпир-диэтил, 90 г/л + 90 г/л + 40 г/л);
- ФАБРИС, ЭМВ (феноксапроп-П-этил + клоквинтосет – мексил (антидот), 69 г/л + 34,5 г/л).

ГЕРБИЦИДЫ СПЛОШНОГО ДЕЙСТВИЯ применяют для уничтожения нежелательной сорной растительности в паровых полях. Безопасны для последующих культур севооборота.

- РАП, ВР (глифосата кислота в виде изопропиламинной соли, 360 г/л);
- РАП 600, ВР (глифосата кислота в виде калийной соли, 600 г/л).

ИНСЕКТИЦИДЫ

ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ ИНСЕКТОАКАРИЦИДЫ – препараты нервно – паралитического действия, обладающие высокой биологической активностью против всех систематических групп насекомых и некоторых клещей. Относятся к группе контактно – кишечных препаратов. К ним относятся:

- ДЕСАНТ, КЭ (диметоат, 400 г/л);
- РИКОШЕТ, КЭ (диазинон, 600 г/л).

ПИРЕТРОИДНЫЕ ИНСЕКТИЦИДЫ при попадании в организм насекомых вместе с пищей или дыхательные пути оказывают действие на нервную систему, вызывая

*препарат находится на стадии регистрации



ЭЛАСТЕР

РЕКОМЕНДУЕТСЯ к применению на зерновых ПРИ
ПРЕОБЛАДАНИИ ГОРЧИЦЫ ПОЛЕВОЙ, ОСОТОВ, БОДЯКА
ПОЛЕВОГО, ГРЕЧИШКИ ТАТАРСКОЙ